

MUESTRAS DE LABORATORIO

sarampión, rubéola


Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
Provincia de Buenos Aires

SIEMPRE se debe tomar muestras de **SUERO, ORINA** e **HISOPADO NASOFARINGEO (HNF)** en el primer contacto con el paciente, para no perder oportunidad.

TIEMPOS PARA LA TOMA DE MUESTRA



hasta los 30 días del exantema




hasta los 7 días del exantema



hasta los 14 días del exantema


SUERO ¿CUÁNDO SE TOMA SEGUNDA MUESTRA DE SUERO?

cuando la primer muestra de suero se tomó antes del 5to día de exantema



ANTES DEL 5° DIA DE EXANTEMA siempre se toma 2ª muestra, a los 10 días de la primera.

cuando la primer muestra de suero se tomó luego del 5to día de exantema y el resultado fue IgM + o IgM indeterminado



DESPUÉS DEL 5° DIA DE EXANTEMA siempre se toma 2ª muestra ante IgM + o IgM indeterminada, a los 10 días de la primera.

En **TODOS** los casos las muestras de **SUERO** (sangre) deben ser procesadas por **LABORATORIOS DE REFERENCIA PROVINCIAL**

Mientras que las muestras de **ORINA** e **HNF** se derivan directamente al **ANLIS MALBRAN** para su estudio

LABORATORIOS DE REFERENCIA PROVINCIAL SEGÚN JURISDICCIÓN

HTAL SAN JUAN DE DIOS	II, III, IV, X, XI
HIGA PEDRO FIORITO	VI
HTAL P.V. CORDERO	V
HIGA DIEGO PAROISSIEN	VII, XII
INE DR. J. H. JARA	I, VIII, IX